

## CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES

SESSION DE 2018

## COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES

Classes de terminales ES et L

DURÉE : 5 HEURES

La calculatrice est autorisée conformément à la réglementation.  
La clarté et la précision de la rédaction seront prises en compte dans l'appréciation de la copie.

*Le sujet comporte deux problèmes indépendants.*

*Le candidat peut traiter les questions dans l'ordre de son choix, à condition de l'indiquer clairement dans la copie.*

**Consignes aux candidats**

- Ne pas utiliser d'encre claire
- N'utiliser ni colle, ni agrafe
- Numéroté chaque page en bas à droite (numéro de page / nombre total de pages)
- Sur chaque copie, renseigner l'en-tête + l'identification du concours :

Concours / Examen : CGL

Section/S spécialité/Série : MAESL

Epreuve : 101

Matière : MESL

Session : 2018

Tournez la page S.V.P.

## PROBLÈME I

On lance indéfiniment une pièce dont la probabilité de tomber sur Pile est  $p \in ]0, 1[$ , et celle de tomber sur Face est  $q = 1 - p$ . On suppose les lancers indépendants.

1° Dans cette question, on lance la pièce trois fois.

- (a) Quelle est la probabilité que la pièce tombe sur Face lors des deux premiers lancers et sur Pile lors du troisième lancer ?
- (b) Quelle est la probabilité que la pièce tombe sur Face lors des trois lancers ?

Pour tout entier naturel  $k$  supérieur ou égal à 1, on pose  $p_k = q^{k-1} - q^k$ . On définit de plus

$$S_k = p_1 + \dots + p_k \quad \text{et} \quad E_k = p_1 + 2p_2 + \dots + kp_k.$$

2° Soit  $k$  un entier supérieur ou égal à 1.

- (a) Montrer  $p_k = pq^{k-1}$ .
- (b) Montrer  $S_k = 1 - q^k$ .
- (c) Montrer  $E_3 = 1 + q + q^2 - 3q^3$ .
- (d) Montrer  $E_k = 1 + q + \dots + q^{k-1} - kq^k$ .

3° (a) Déterminer la limite de la suite  $(S_n)$ .

(b) On admet que la suite  $(nq^n)$  converge vers 0.

Montrer que la suite  $(E_n)$  converge vers une limite  $E$  égale à  $\frac{1}{p}$ .

Soit  $n$  un entier supérieur ou égal à 1. On lance la pièce  $n$  fois successivement et on s'intéresse à la première apparition de Pile. On note  $X_n$  la variable aléatoire égale au numéro de cette première apparition de Pile dans les  $n$  lancers quand elle existe, avec la convention que  $X_n = 0$  si la pièce ne tombe jamais sur Pile dans les  $n$  lancers. Autrement dit :

- $X_n = 0$  si la pièce tombe toujours sur Face lors des  $n$  lancers ;
- $X_n = 1$  si la pièce tombe sur Pile lors du premier lancer ;

et, pour tout entier  $k$  tel que  $2 \leq k \leq n$ ,

- $X_n = k$  si la pièce tombe sur Face lors des  $k - 1$  premiers lancers et sur Pile lors du lancer numéro  $k$ .

4° On conserve les notations qui précèdent, et on note  $P(A)$  la probabilité d'un événement  $A$ .

- (a) Pour  $k$  entier tel que  $1 \leq k \leq n$ , montrer que  $P(X_n = k) = p_k$ .
- (b) Déterminer  $P(X_n = 0)$ .
- (c) Donner une interprétation probabiliste de la question 3°(a).

5° (a) Que représente  $E_n$  ?

(b) Donner une interprétation probabiliste de la question 3°(b).

6° On rappelle que  $E$  a été défini dans la question 3°(b). Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on note  $Q_n = \frac{E_n}{E}$ .

On s'intéresse au graphique reliant les points de coordonnées  $(S_n, Q_n)$ .

(a) Justifier que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $Q_n = S_n - np(1 - S_n)$ .

(b) Vérifier que  $n = \frac{\ln(1 - S_n)}{\ln q}$ , puis  $Q_n = S_n - \frac{p}{\ln q}(1 - S_n) \ln(1 - S_n)$ .

(c) En déduire une fonction  $f$  telle que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $Q_n = f(S_n)$ .

7° (a) Justifier que  $f$  est convexe sur  $]0, 1[$  et calculer  $f(0)$ .

(b) On admet que  $z \ln(z)$  tend vers 0 lorsque  $z$  tend vers 0 par valeurs supérieures. En déduire la limite de  $f(x)$  quand  $x$  tend vers 1 par valeurs inférieures.

(c) Que peut-on dire de la position de la courbe de  $f$  par rapport à la droite d'équation  $y = x$  ? Donner l'allure de la courbe de  $f$  sur  $]0, 1[$ .

8° (a) Vérifier qu'une primitive de la fonction  $x \mapsto (1-x) \ln(1-x)$  sur  $]0, 1[$  est  $x \mapsto \frac{(1-x)^2}{2} \left( \frac{1}{2} - \ln(1-x) \right)$ .

(b) Soit  $A \in ]0, 1[$ . En déduire la valeur de  $\int_0^A f(x) dx$ .

(c) On appelle indice de Gini associé à la fonction  $f$  le réel égal à deux fois l'aire située entre la courbe de  $f$  et la droite d'équation  $y = x$ .

Déduire de ce qui précède que l'indice de Gini associé à  $f$  est  $G(p) = -\frac{p}{2 \ln(1-p)}$ .

## PROBLÈME II

L'objectif de ce problème est d'étudier, pour tout entier  $n$  supérieur ou égal à 2, l'équation

$$x^n = x^{n-1} + \dots + x + 1$$

où l'inconnue  $x$  est un nombre réel.

1° Soit  $P_2$  la fonction polynôme définie, pour tout réel  $x$ , par

$$P_2(x) = x^2 - x - 1.$$

Résoudre l'équation  $P_2(x) = 0$ . Montrer que l'une des solutions est strictement inférieure à 0 et que l'autre solution est strictement supérieure à 1.

2° Soit  $P_3$  la fonction polynôme définie, pour tout réel  $x$ , par

$$P_3(x) = x^3 - x^2 - x - 1.$$

(a) En étudiant les variations de  $P_3$ , montrer que l'équation  $P_3(x) = 0$  admet une unique solution réelle, que l'on notera  $a_3$  et qu'on ne cherchera pas à calculer. Montrer que  $a_3 > 1$ .

(b) Écrire un algorithme qui donne une valeur approchée de  $a_3$  à  $10^{-3}$  près.

3° Soit  $P_4$  la fonction polynôme définie, pour tout réel  $x$ , par

$$P_4(x) = x^4 - x^3 - x^2 - x - 1.$$

Montrer que l'équation  $P_4(x) = 0$  admet deux solutions  $a_4$  et  $b_2$  telles que  $b_2 < 0 < 1 < a_4$ . On ne cherchera à calculer ni  $a_4$  ni  $b_2$ .

On se place maintenant dans le cas général.

On désignera désormais par  $n$  un entier supérieur ou égal à 2.

On note  $P_n$  la fonction polynôme définie, pour tout nombre réel  $x$ , par

$$P_n(x) = x^n - x^{n-1} - x^{n-2} - \dots - x - 1 = x^n - \sum_{k=0}^{n-1} x^k,$$

et on pose, pour tout nombre réel  $x$ ,  $Q_n(x) = x^{n+1} - 2x^n + 1$ .

4° (a) Donner une expression de  $1 + x + \dots + x^{n-1}$  lorsque  $x$  est réel et  $x \neq 1$ .

(b) En déduire que, pour tout nombre réel  $x$ ,  $P_n(x) = 0$  implique  $Q_n(x) = 0$ .

(c) L'implication réciproque est-elle vraie ?

5° (a) Calculer la fonction dérivée de  $Q_n$  et résoudre sur  $\mathbb{R}$  l'équation  $Q_n'(x) = 0$ .

(b) Donner le tableau de variations de  $Q_n$  sur  $[0, +\infty[$ . Préciser les valeurs de  $Q_n(1)$  et  $Q_n(2)$ .

(c) En déduire que, dans l'intervalle  $]1, 2[$ , l'équation  $Q_n(x) = 0$  possède une unique solution. On note  $a_n$  cette solution, qu'on ne cherchera pas à calculer.

(d) Montrer que  $a_n$  est l'unique solution positive ou nulle de l'équation  $P_n(x) = 0$ .

6° Quelle est la limite de la suite  $(\frac{2n}{n+1})$  ?

On admet le théorème d'encadrement suivant : si  $(u_n)$ ,  $(v_n)$ ,  $(w_n)$  sont trois suites réelles telles que, pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_n \leq v_n \leq w_n$ , et si  $(u_n)$  et  $(w_n)$  convergent vers une même limite  $\ell$ , alors  $(v_n)$  converge aussi vers  $\ell$ .

7° Montrer que la suite  $(a_n)$  est convergente et donner sa limite.

Dans les questions suivantes, on suppose que  $n$  est un entier naturel pair supérieur ou égal à 2.  
On note  $k$  l'entier tel que  $n = 2k$ .

- 8° (a) Montrer que  $Q_{2k}$  est strictement croissante sur  $]-\infty, 0]$ .  
(b) Préciser  $Q_{2k}(-1)$ .  
(c) Montrer que l'équation  $P_{2k}(x) = 0$  admet une unique solution appartenant à  $]-1, 0[$ . On note  $b_k$  cette solution.  
(d) Combien l'équation  $P_{2k}(x) = 0$  a-t-elle de solutions dans  $\mathbb{R}$ ?
- 9° (a) Montrer que, pour tout nombre réel appartenant à  $]-1, 0[$ , on a  $Q_{2k+2}(x) \geq Q_{2k}(x)$ .  
(b) En déduire le signe de  $Q_{2k+2}(b_k)$ .  
(c) Montrer  $b_{k+1} \leq b_k$ .

Les questions précédentes permettent d'établir que la suite  $(b_k)$  est une suite décroissante dans  $]-1, 0[$ .  
On admet que cela entraîne que cette suite converge vers un nombre réel  $\ell$  appartenant à  $[-1, 0]$ . Le but de la question suivante est de montrer que  $\ell = -1$ .

- 10° (a) Pour tout entier  $k$ , déterminer le signe de  $Q_{2k}(\ell)$ .  
(b) Soit  $x \in ]-1, 0[$ . Que peut-on dire de  $Q_{2k}(x)$  quand  $k$  tend vers l'infini?  
(c) En déduire que  $\ell = -1$ .
- 11° Montrer que la suite  $(b_k^{2k})$  converge vers une limite qu'on déterminera.